

Ordeño 15 al 8%

Sal Mineralizada con Probióticos

PRODUCCIÓN 15-20 L/DÍA

REGISTRO ICA No. 7041SL



DESCRIPCIÓN

Rentasal Ordeño 15 al 8% es una sal mineralizada formulada para bovinos en producción láctea de 15 a 20 litros de leche al día, idealmente en praderas con aporte foliar de fósforo entre 0,25% y 0,35% en base seca.

También puede ofrecerse a toros reproductores en servicio y vacas gestantes desde 20 días antes del parto.

MODO DE USO

Suministrar a voluntad y en forma permanente en saladeros protegidos del sol y del agua.

PRECAUCIONES

- Mantener saladeros protegidos del sol y del agua.
- Mantener agua fresca disponible.
- Validar uso según nivel de producción, tipo de pasto y etapa productiva.

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

En vacas de leche, la suplementación mineral debe ajustarse al nivel de producción, consumo de materia seca, calidad del forraje y concentrados suministrados.

USO RECOMENDADO

MARCA	Rentasal
LÍNEA	Sales mineralizadas para leche
ESPECIE	Bovinos
ETAPA	Producción láctea, reproducción y gestación
OBJETIVO	Apoyar suplementación mineral en vacas de producción media-alta

REGISTRO ICA No. 7041SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTO	LÍMITE	CANTIDAD
Fósforo	MÍNIMO	8%
Calcio	MÍNIMO	18%
Cloruro de sodio	MÍNIMO	25%
Azufre	MÍNIMO	1%
Magnesio	MÍNIMO	0,2%
Cobre	MÍNIMO	0,018%
Zinc	MÍNIMO	0,13%
Cobalto	MÍNIMO	0,003%
Yodo	MÍNIMO	0,002%
Selenio	MÍNIMO	0,001%
Flúor	MÁXIMO	0,08%
Humedad	MÁXIMO	5%
Bacillus subtilis	MÍNIMO	35×10 ⁵ UFC/g
Saccharomyces cerevisiae	MÍNIMO	35×10 ⁵ UFC/g
Enterococcus faecium	MÍNIMO	35×10 ⁵ UFC/g
Bifidobacterium spp.	MÍNIMO	35×10 ⁵ UFC/g
Lactobacillus spp.	MÍNIMO	35×10 ⁵ UFC/g

PRESENTACIÓN

- Bulto a granel de 50 kg.
- Bulto a granel de 40 kg.
- Bloque de 20 kg.
- Maruza de 10 kg.

● Para una recomendación más precisa, valide con el asesor técnico Produgán: tipo de ganado, etapa productiva, número de animales, ubicación, tipo de pasto, clima, problema principal, objetivo productivo, suplementación actual y época del año.

● Las fuentes técnicas de extensión agropecuaria recomiendan ajustar la suplementación mineral según análisis de dieta, forraje, etapa productiva y consumo real, porque el libre consumo no garantiza que todos los animales reciban exactamente la misma cantidad.