

Especial 0,5%

Sal Mineralizada

DESTETE • LEVANTE • CEBAS

REGISTRO ICA No. 7023SL



DESCRIPCIÓN

Agrosal Especial 0,5% es una sal mineralizada diseñada para bovinos machos en etapas de destete, levante y ceba, especialmente animales que pastan en praderas con aportes aproximados de 0,2% de calcio y 0,15% de fósforo en base seca.

La ficha indica que debe usarse teniendo en cuenta la concentración y disponibilidad de minerales en las pasturas, para cubrir necesidades nutricionales y apoyar la productividad del ganado.

MODO DE USO

Suministrar a voluntad y de forma permanente en saladeros protegidos del sol y la lluvia.

La ficha recomienda consultar con médico veterinario o zootecnista.

PRECAUCIONES

- Mantener en saladeros protegidos del sol y la lluvia.
- Mantener agua fresca disponible.
- Validar uso según tipo de pasto, disponibilidad de forraje y objetivo productivo.

INFORMACIÓN TÉCNICA ADICIONAL

En sales mineralizadas de libre consumo, el consumo puede variar por ubicación del saladero, cercanía al agua, humedad, competencia entre animales y palatabilidad; conviene revisar consumo real por lote.

USO RECOMENDADO

MARCA	Agrosal
LÍNEA	Sales mineralizadas
ESPECIE	Bovinos
ETAPA	Destete, levante y ceba
USO	Ceba
OBJETIVO	Suplementación mineral para bovinos machos en desarrollo y ceba

REGISTRO ICA No. 7023SL

COMPOSICIÓN GARANTIZADA

ELEMENTO	LÍMITE	CANTIDAD
Fósforo	MÍNIMO	0,5%
Calcio	MÍNIMO	2%
Cloruro de sodio	MÍNIMO	30%
Azufre	MÍNIMO	0,1%
Magnesio	MÍNIMO	0,2%
Cobre	MÍNIMO	0,015%
Zinc	MÍNIMO	0,03%
Cobalto	MÍNIMO	0,0005%
Yodo	MÍNIMO	0,003%
Flúor	MÁXIMO	0,005%
Humedad	MÁXIMO	5%

PRESENTACIÓN

- Bulto a granel de 50 kg: 10 bolsas de 5 kg.
- Bulto a granel de 50 kg x 1 kg.
- Bulto a granel de 50 kg.
- Bulto a granel de 40 kg.
- Maruza de 10 kg.

● Para una recomendación más precisa, valide con el asesor técnico Produgán: tipo de ganado, etapa productiva, número de animales, ubicación, tipo de pasto, clima, problema principal, objetivo productivo, suplementación actual y época del año.

● Las fuentes técnicas de extensión agropecuaria recomiendan ajustar la suplementación mineral según análisis de dieta, forraje, etapa productiva y consumo real, porque el libre consumo no garantiza que todos los animales reciban exactamente la misma cantidad.